

【生薬製剤】

フラーリン® Q

第3類医薬品

* ⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
ひ ふ 皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

- 1ヵ月位(子宮出血に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

貧血、月経不順、月経痛、子宮出血、妊婦強壮薬、産前産後の強壮薬、腰痛

用法・用量

次の量を随時^{注)}、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

^{注)}「随時服用」とは食前・食間(食後2～3時間)・食後のいつ服用してもよいことを指しますが、胃腸の弱い方は食後の服用がよいでしょう。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1.5g(添付のサジ2杯)	3回
10歳以上15歳未満	成人の2/3の量(1.0 g)	
5歳以上10歳未満	成人の1/2の量(0.75 g)	
5歳未満	成人の1/4の量(0.375g)	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。
- 生後3ヵ月未満の乳児には服用させないこと。

成分・分量

本剤4.5g中

センキュウ	0.882g	}	エキス…2.206mL (固形物として0.088g)
タクシヤ	1.765g		
トウキ	0.882g		

タイソウエキス	2.403mL	}	混合物…4.412g
(固形物として)	0.368g		
オウギ末	0.061g		
カンゾウ末	0.368g		
ケイヒ末	0.797g		
シャクヤク末	1.225g		
ショウキョウ末	0.306g		
ソウジュツ末	0.613g		
トウキ末	0.061g		
ブクリョウ末	0.613g		

- ・本剤は褐色で、特異なおいを有し、味は初めわずかに甘く後わずかに苦い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

フラーリンQは生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考慮して正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師、薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号