

この添付文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読み下さい。

【瀉下薬(便秘薬)】

活潤仙

第2類医薬品

- ◆ 活潤仙は、生薬の働きを活かして腹部を温めながら腸の排便能力を促し、便秘を改善することができるように考えられた6種類の生薬を配合した便秘薬です。
- ◆ 活潤仙中の、ジオクテルソジウムスルホサクシネートは固くなった大便の表面を軟らかくし、ダイオウの適度の刺激が腸の蠕動運動ぜんどうを高めて排便をスムーズにさせます。トウキ・センキュウ・シャクヤク・ジオウは便秘の原因となる腹部の血行を良くして、コウボクはおなか(おなか)が張るのを抑えるように働きます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人(お母さん)は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
3. 大量に服用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5) 高齢者。
 - (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

○便秘

○便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

用法・用量

次の量を就寝前に服用して下さい。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量して下さい。

年齢	1回量		1日服用回数
	2～3日便通がないとき	2～4錠	
15歳以上	4日以上便通がないとき	4～6錠	1回
	服用しないこと		
15歳未満	服用しないこと		

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守すること。

成分・分量

本剤 6錠(1.8g)中

コウボクエキス…… 25mg	トウキエキス……120mg
ジオウエキス……250mg	ダイオウ末……800mg
シャクヤクエキス……120mg	ジオクチルソジウム
センキュウエキス……100mg	スルホサクシネート……120mg

添加物としてステアリン酸マグネシウム、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有する。

- ・本剤は黄褐色で、特異なおいを有し、味は苦い素錠です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調が異なることや、また天然生薬色素により容器・包装等が黄味を帯びることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

活潤仙は生薬の特性を活かした生薬配合製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、活潤仙のことをご理解いただいている薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号