

この添付文書は、お薬とともに保管し、
服用の際には、必ずお読み下さい。

【神経痛・リウマチ用生薬製剤】

ロイルック錠

第2類医薬品

- ◆ ロイルック錠は、神経痛・リウマチ・関節痛・筋肉痛などの痛みを改善するために考え出された生薬製剤です。
- ◆ ロイルック錠中のカンゾウ・キョウカツ・チンピ・ビャクシ・ボウイ・ボウフウ・リュウタンなどは神経痛・リウマチなどの痛みを和らげるように働きます。トウキ・シヤクヤク・センキュウ・ジオウ・トウニン・ブクリョウ・ソウジュツ・イレイセン・ゴシツ・ショウキョウは神経痛・リウマチ・関節痛・筋肉痛などの状態が回復するように手助けします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

リウマチ、神経痛、関節痛、筋肉痛、打撲痛

用法・用量

次の量を食後に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	5 錠	3 回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守すること。

成分・分量

本剤15錠(5.175g)中

イレイセン0.30 g・カンゾウ0.050g・キョウカツ0.50 g・ゴシツ0.50g ジオウ0.70 g・シャクヤク0.80 g・ショウキョウ0.050g・センキュウ0.70g ソウジュツ0.050g・チンピ0.10 g・トウキ0.70 g・トウニン0.20g ビヤクシ0.20 g・ブクリョウ0.050g・ボウイ0.50 g・ボウフウ0.50g リュウタン0.050g	} エキス …0.70g
--	-----------------

カンゾウ末……0.90 g、ショウキョウ末……0.10g、ソウジュツ末……1.3 g
チンピ末……0.050g、ブクリョウ末……1.4 g、リュウタン末……0.050g

添加物としてカルナバロウ、軽質無水ケイ酸、酸化チタン、三二酸化鉄、ステアリン酸
マグネシウム、デキストリン、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロースを含有する。

- ・本剤は淡赤色で、特異なおいを有し、味は初めなく後辛いフィルムコーティング錠です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、内容物の色調は多少異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 錠剤に水分が付くと、表面のコーティングが溶けることがありますので、誤って水滴をおとしたり、ぬれた手で触れないように注意して下さい。

薬と養生

ロイルック錠は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考慮して正しく服用することが大切です。

また、気持ちの持ち方(気の養生)や食生活(食の養生)に注意することも、病気を治すためには大事なことです。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤や養生方法のことをご理解いただいている医師やホノミ漢方会々員の薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号