

この添付文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読み下さい。

【いぼ・肌あれ用生薬製剤】

コイクラセリド[®]

第2類医薬品

- ◆ コイクラセリドは、いぼ・さめ肌・ソバカス・肌あれを改善するように考え出された生薬製剤です。
- ◆ コイクラセリドのヨクイニンはいぼ・肌あれなどを改善するように働き、カンゾウ・カゴソウはヨクイニンの働きを手助けします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師の診療を受けること

| 症状の名称 | 症 状 |
|---------------------|---|
| 偽アルドステロン症、 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

いぼ、さめ肌、ソバカス、肌あれ

用法・用量

次の量を食後に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

| 年 齢 | 1 回量 | | 1 日服用回数 |
|------------|-----------------|--------|---------|
| | 容器入りの場合 | 分包品の場合 | |
| 大 人 | 1.5g(添付のサジ1杯) | 1 包 | 3 回 |
| 12歳以上15歳未満 | 大人の2/3の量(1.0 g) | 2/3包 | |
| 7歳以上12歳未満 | 大人の1/2の量(0.75g) | 1/2包 | |
| 4歳以上 7歳未満 | 大人の1/3の量(0.5 g) | 1/3包 | |
| 4 歳未満 | 服用しないこと | | |

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤4.5g又は3包中

カゴソウ…………… 2.4g } エキス……………0.90g
ヨクイニン……………12.0g }

カンゾウ末…………… 3.6 g

- ・本剤は淡黄褐色で、特異なおいを有し、味は甘い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

コイクラセリドは生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師、薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号