

【生薬製剤】

ジンソインエキスサン

第3類医薬品

* ⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
ひ ぶ 皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1週間間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

四季の感冒、はなかぜの補助療法

用法・用量

次の量を食前又は食間^{注)}に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「食間」とは食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
大 人	0.6g (添付のサジ1杯)	3回
8歳以上15歳未満	大人の1/2の量(0.3 g)	
8歳未満	大人の1/4の量(0.15g)	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。
- 生後3ヵ月未満の乳児には服用させないこと。

成分・分量

本剤1.8g中

カ ッ コ ン	0.300g	チクセツニンジン	0.005g	} エキス……0.300g
カ ン ズ ウ	0.010g	チ ン ピ	0.200g	
キ キ ヨ ウ	0.700g	ハ ン ゲ	0.500g	
キ ジ ツ	0.010g	ブ ク リ ヨ ウ	0.100g	
シ ヨ ウ キ ヨ ウ	0.005g	モ ッ コ ウ	0.005g	
ソ ヨ ウ	0.300g	ゼ ン コ	0.500g	
タ イ ソ ウ	0.005g			
カ ン ズ ウ 末	0.400g			
シ ヨ ウ キ ヨ ウ 末	0.050g			
ブ ク リ ヨ ウ 末	0.800g			
キ ジ ツ 末	0.250g			

- ・本剤は褐色で、特異なおいを有し、味は初め苦く後甘い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

ジンソインエキスサンは生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師、薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剤盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剤盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号