

【アレルギー性皮膚疾患用生薬製剤】

アクトマン®

第2類医薬品

- ◆ アクトマンは、アレルギー体質の人にきび・湿疹・皮膚炎・蕁麻疹・皮膚瘙痒症といった皮膚の症状を改善するように考え出された生薬製剤です。
- ◆ アクトマン中のオウレン・オウゴン・オウバク・サンシシ・サイコ・カンゾウは湿疹や皮膚炎などの皮膚の炎症を鎮め、トウキ・シャクヤク・センキュウ・ジオウは湿疹や皮膚炎などの回復を手助けするように働きます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (4) 高齢者。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢
4. 1ヵ月位(はなぢに服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
6. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

アレルギー性体質のものの次の諸症：にきび、湿疹、皮膚炎、蕁麻疹、皮膚瘙痒症^{a)}、はなぢ
a)皮膚瘙痒症：皮膚がかゆい状態を示します。

用法・用量

次の量を随時^{注)}、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「随時服用」とは食前・食間(食後2~3時間)・食後のいつ服用してもよいことを指しますが、胃腸の弱い方は食後の服用がよいでしょう。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	5 錠	3 回
12歳以上15歳未満	4 錠	
7歳以上12歳未満	3 錠	
5歳以上 7歳未満	2 錠	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤15錠(3.525g)中	
オウゴン	1.0 g
オウバク	0.01g
オウレン	0.01g
カンゾウ	0.25g
サイコ	3.0 g
サンシシ	0.5g
ジオウ	1.5g
シャクヤク	1.5g
センキュウ	1.5g
トウキ	1.5g
エキス	1.0g
オウゴン末	0.7 g
オウバク末	0.7 g
オウレン末	0.1 g
サンシシ末	0.5 g

添加物として黄色5号、カルナウバロウ、軽質無水ケイ酸、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロースを含有する。

- ・本剤は淡灰黄赤色で、においはほとんどなく、味は初めなく後苦いフィルムコーティング錠です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、内容物の色調は多少異なることがあります、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 錠剤に水分が付くと、表面のコーティングが溶けますので、誤って水滴をおとしたり、ぬれた手で触れないように注意して下さい。

薬と養生

アクトマンは生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

また、気持ちの持ち方(気の養生)や食生活(食の養生)に注意することも、病気を治すためには大事なことです。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤や養生方法のことをご理解いただいている医師やホノミ漢方会々員の薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剤盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

 剤盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号