

この添付文書は、お薬とともに保管し、
服用の際には、必ずお読み下さい。

【高血圧症用生薬製剤】

サイロ®

第2類医薬品

- ◆ サイロは、高血圧症(軽症)や高血圧に伴う症状を改善するために考え出された生薬製剤です。
- ◆ サイロ中のシャクナゲヨウ・カイカ・ケツメイシは身体にあった血圧に調整し、センキュウ・カノコソウは高血圧症の改善を手助けするように働きます。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと
15歳未満の小児。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 次の医薬品を服用している人。
血圧降下剤
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
軟便、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

高血圧症(軽症)、高血圧の随伴症状^{a)}(不眠、肩こり、耳なり、めまい、動悸^{どうき}、頭痛)

^{a)}高血圧の随伴症状：高血圧に伴って起こる症状のことを示します。

(裏面へ)

用法・用量

次の量を、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大 人	3～5 カプセル	1～2 回

※大人は15歳以上を指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 15歳未満の小児には服用させないこと。

成分・分量

本剤10カプセル(4g)中

ケ ツ メ イ シ……2.86g	} 水製エキス…1.14g	カ ノ コ ソ ウ 末……1.14g
セ ン キ ユ ウ……0.57g		カ イ カ 末……1.72g
シ ャ ク ナ ゲ ヨ ウ……2.29g		

添加物として青色1号、赤色3号、黄色5号、酸化チタン、セラチン、ラウリル硫酸ナトリウムを含有する。

- ・本剤は褐色(キャップ)とだいたい色(ボディ)の二色のカプセル剤で、その内容物は黒褐色で、特異なおいを有し、味は苦い粉末です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、内容物の色調は多少異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

薬と養生

サイロは生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

また、気持ちの持ち方(気の養生)や食生活(食の養生)に注意することも、病気を治すためには大事なことです。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤や養生方法のことをご理解いただいている医師やホノミ漢方会々員の薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記をお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号