

この添付文書は、お薬とともに保管し、ご使用の際には、必ずお読み下さい。

【創傷性皮膚疾患用薬】

ジュンキ 潤肌®

第3類医薬品

- ◆ ジュンキは、ひび・あかぎれなどの創傷性の皮膚疾患や、血行障害により起るしもやけなど、さらには火傷(やけど)を改善するよう考え出された外用の軟膏剤(塗り薬)です。
- ◆ ジュンキ中のシコンはトウキとともに新しい皮膚の形成を助け、外傷やただれなどの傷口の治りを早めます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。
 - (4) 傷口が化膿している人。
 - (5) 患部が広範囲の人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

3. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

ひび、あかぎれ、しもやけ、魚の目、あせも、ただれ、外傷、火傷、痔核^{a)}による疼痛、肛門裂傷^{b)}、湿疹・皮膚炎

a)痔核：いぼ痔のことを示します。

b)肛門裂傷：きれ痔のことを示します。

用法・用量

患部に1日数回塗布、又はガーゼなどに延ばして貼って下さい。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 目に入らないよう注意すること。
- (5) 患部を清潔にしてから使用すること。

成分・分量

本剤100g中

シコン……8.31g } 油脂性抽出物……100g
トウキ……8.31g }

添加物としてゴマ油、ミツロウを含有する。

- ・本剤は赤紫色で、特異なにおいを有する軟膏剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますですが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
【40℃以上の高温の場所を避けること。晴天の日は自動車内が高温になるので放置しないこと。】
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 有効成分シコンの紫色は染料にも使用される色素です。そのため、衣服やくつ下などに薬剤が付着すると色が落ちにくいので、ご注意下さい。

使用ポイント

ご使用に当たっては下記の事項を参考に塗布するようにして下さい。

| | |
|-----------------|---|
| ひび、あかぎれ | 患部に軟膏をうすくすり込んで下さい。 |
| しもやけ | 皮膚表面がしっかりとしている場合は、患部に軟膏をうすくすり込んで下さい。ただれた状態になっている場合、ガーゼに軟膏を1mm位の厚さに塗って患部に貼って下さい。 |
| 魚の目 | 軟膏をすり込んだ後、ガーゼに軟膏を1mm位の厚さに塗って患部に貼って下さい。 |
| あせも 湿疹・皮膚炎 | 患部に軟膏をうすくすり込んで下さい。患部を刺激するためにすり込むことができない場合は、ガーゼに軟膏を1mm位の厚さに塗って患部に貼って下さい。 |
| ただれ | 刺激の少ない消毒剤で患部を消毒した後、ガーゼに軟膏を1mm位の厚さに塗って患部に貼って下さい。 |
| 外傷 | 傷口を消毒剤で消毒した後、ガーゼに軟膏を十分延ばして患部に貼って下さい。軟膏のついていないガーゼが傷口について痛むことがありますので、軟膏を十分な広さに塗るようにして下さい。 |
| 火傷 | 軟膏を患部へ直接1mm位の厚さに塗って下さい。 |
| 痔核による疼痛 肛門裂傷 | 患部を消毒剤で消毒した後、軟膏をうすくすり込んで下さい。患部を刺激するためにすり込むことができない場合は、ガーゼに軟膏を1mm位の厚さに塗って患部に貼って下さい。 |

ジュンキは生薬の特性を活かした軟膏剤ですので、あなたの体质や病状を考えて正しく使用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の使用に際しては、ジュンキのことをご理解いただいている薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剤盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

製造販売元

剤盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号