

【漢方薬】

この添付文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読み下さい。

爽風仙®

第2類医薬品

- ◆ 年齢を重ねるにつれて聴力が衰えてくると、耳が遠くなったり、耳鳴りを起こしたり、またそれらに伴ってめまいが現れることがあります。
- ◆ 爽風仙は、「じじんつうじとう滋腎通耳湯」という処方をもとにした漢方薬で、体力虚弱で、耳鳴り、聴力低下、めまいのある人に効果があります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (4) 高齢者。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要がありますので、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力虚弱なものの次の諸症：耳鳴り、聴力低下、めまい

用法・用量

次の量を食前又は食間^{注)}に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「食間」とは食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	5 錠	3 回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守すること。

成分・分量

本剤15錠(4.5g)中

オウゴン	1.25g	}	滋腎通耳湯エキス	3.2g
オウバク	1.25g			
コウブシ	1.25g			
サイコ	1.25g			
ジオウ	1.25g			
シャクヤク	1.25g			
センキュウ	1.25g			
チモ	1.25g			
トウキ	1.25g			
ビャクシ	1.25g			

添加物として含水二酸化ケイ素、クロスカルメロースナトリウム、クロスポビドン、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

- ・本剤は淡灰褐色で、特異なおいを有し、味は苦い素錠です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

爽風仙は生薬の特性を活かした漢方薬ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、爽風仙のことをご理解いただいている薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号