

【糖尿病用生薬配合製剤】

この添付文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読み下さい。

華蔘仙®

第2類医薬品

販売名：ハナジンセン

- ◆ ハナジンセンは、糖尿病を改善するために考え出された8種類の生薬を配合したお薬です。
- ◆ ハナジンセン中のカッコン・カロコンは血糖増加による口渇(口のかわき)を抑え、ゴミシ・バクモンドウ・カンゾウ・ジオウ・オウレン・ニンジンなどは糖尿病の回復を手助けします。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと
透析療法を受けている人。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
 - 次の医薬品を服用している人。
血糖降下剤
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

糖尿病、血糖増加による口渇^{a)}

^{a)}口渇：口のかわきのことを示します。

用法・用量

次の量を随時^{注)}、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

^{注)}「随時服用」とは食前・食間(食後2～3時間)・食後のいつ服用してもよいことを指しますが、胃腸の弱い方は食後の服用がよいでしょう。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1～1.5g(添付のサジ1杯は1gです)	2～3回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守すること。

成分・分量

本剤750g中

カ ッ コ ン	333.34g	} 水製エキス	} 166.67g	} ダイアベトンA	} 500g
カ ロ コ ン	166.67g				
カ ン ゾ ウ	166.67g				
ゴ ミ シ	333.34g				
ジ オ ウ	333.34g				
バクモンドウ	333.34g				
カ ロ コ ン 末	166.67g	}	}	}	}
カ ン ゾ ウ 末	166.67g				
オ ウ レ ン 末	35g				
ニ ン ジ ン 末	8g				
合成ケイ酸アルミニウム	207g				

- ・本剤は淡灰褐色で、特異なおいを有し、味は苦味がありわずかに酸味のある散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

ハナジンセンは生薬の特性を活かした生薬配合製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、ハナジンセンのことをご理解いただいている薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号