

この添付文書は、お薬とともに保管し、
服用の際には、必ずお読み下さい。

【糖尿病用生薬製剤】

ダイアベトン®

第2類医薬品

- ◆ ダイアベトンは、糖尿病を改善するために考え出された10種類の生薬から成る生薬製剤です。
- ◆ ダイアベトン中のカッコン・カロコンは血糖増加による口渴(口のかわき)を抑え、ゴミシ・バクモンドウ・ブクリョウ・カンゾウ・トウキ・ジオウ・オウレン・ニンジン(※)は糖尿病の回復を手助けします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 次の医薬品を服用している人。

血糖降下剤

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------------|
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

糖尿病、血糖増加による口渴^{a)}

^{a)} 口渴：口のかわきのことを示します。

用法・用量

次の量を食後に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

| 年 齢 | 1 回量 | | 1 日服用回数 |
|-----------|-------------|--------|---------|
| | 容器入りの場合 | 分包品の場合 | |
| 大人(15歳以上) | 1g(添付のサジ1杯) | 1包 | 3回 |
| 15歳未満 | 服用しないこと | | |

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守すること。

成分・分量

本剤 3g又は3包中

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| オウレン 0.225g・カッコン 0.375g・カロコン 1.5g | } エキス…0.75g |
| カンゾウ 0.15g・ゴミシ 0.75g・ジオウ 1.5g | |
| トウキ 0.75g・ニンジン 0.075g・バクモンドウ 1.5g | |
| ブクリョウ 0.375g | |

オウレン末…0.15g、カンゾウ末…0.75g、ニンジン末…0.375g、ブクリョウ末…0.975g

- ・本剤は淡褐色で、特異なおいを有し、味は極めて苦い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

ダイアベトン[®]は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考慮して正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師、薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

製造販売元

剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号