

この添付文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読み下さい。

【神経痛・リウマチ用生薬製剤】

グレニアチン®

第2類医薬品

- ◆ グレニアチンは、神経痛・リウマチなどの痛みを改善するために考え出された17種類の生薬から成る生薬製剤です。
- ◆ グレニアチン中のカンゾウ・キヨウカツ・チンピ・ビャクシ・ボウイ・ボウフウ・リュウタンなどは神経痛・リウマチなどの痛みを和らげるよう働きます。トウキ・シャクヤク・センキュウ・ジオウ・トウニン・ブクリョウ・ビャクジユツ・イレイセン・ゴシツ・ショウキョウは神経痛・リウマチなどの状態が回復するように手助けします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 今まで薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

リウマチ、神経痛

用法・用量

次の量を食後に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

年 齢	1回量		1日服用回数
	容器入りの場合	分包品の場合	
大人(15歳以上)	1.5g(添付のサジ1杯)	1包	3回
15歳未満	服用しないこと		

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守すること。

成分・分量

本剤4.5g又は3包中

カ　ン　ゾ　ウ0.05g	・ゴ　シ　ツ0.5 g	・ジ　オ　ウ0.7 g	エキス…0.7g
シ　ヤ　ク　ヤ　ク0.8 g	・シ　ヨ　ウ　キ　ヨ　ウ0.05g	・セ　ン　キ　ユ　ウ0.7 g	
チ　ン　ピ0.1 g	・ト　ウ　キ0.7 g	・ト　ウ　ニ　ン0.2 g	
ビ　ヤ　ク　シ0.2 g	・ビ　ヤ　ク　ジ　ュ　ツ0.05g	・ブ　クリ　ヨ　ウ0.05g	
ボ　ウ　イ0.5 g	・ボ　ウ　フ0.5 g	・リ　ユ　ウ　タ　ン0.05g	
イ　レ　イ　セ　ン0.3 g	・キ　ヨ　ウ　カ　ツ0.5 g		

カ　ン　ゾ　ウ　末…0.9g、シ　ヨ　ウ　キ　ヨ　ウ　末…0.1 g、ビ　ヤ　ク　ジ　ュ　ツ　末…1.3 g、
ブ　クリ　ヨ　ウ　末…1.4g、リ　ユ　ウ　タ　ン　末…0.05g、チ　ン　ピ　末…0.05g

・本剤は淡黄褐色で、特異なにおいを有し、味は甘い散剤です。

・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

グレニアチンは生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師、薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剤盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

剤盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号