

【漢方薬】

ホノミ[®] アンセイ粒

第2類医薬品

- ◆ ホノミアンセイ粒は金匱要略^{きんきょうりやく}という書物に書かれている処方を基本にした漢方薬の顆粒剤です。

* ! 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
ひ ふ 皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位(つわりに服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸^{どうき}、めまい、嘔気^{a)}などを伴う次の諸症：不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しづがれ声、のどのつかえ感

a)嘔気：はきけのことを示します。

用法・用量

次の量を食間^{注)}に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「食間」とは食後2~3時間を持ちます。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1.5g(添付のサジ1杯)	
7歳以上15歳未満	成人の2/3の量(1.0 g)	
4歳以上 7歳未満	成人の1/2の量(0.75 g)	
2歳以上 4歳未満	成人の1/3の量(0.5 g)	
2歳未満	成人の1/4の量(0.375g)	3回

<用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること。
- (4) 生後3ヵ月未満の乳児には服用させないこと。

成分・分量

本剤4.5g中

コウボク	1.5g	半夏厚朴湯エキス(1/2量)	0.77g
ショウキョウ	0.5g		
ソヨウ	1.0g		
ハング	3.0g		
ブクリヨウ	2.5g		

添加物としてカルメロースカルシウム、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有する。

- ・本剤は淡褐色で、特異なにおいを有し、味は辛い顆粒剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

ホノミアンセイ粒は生薬の特性を活かした漢方薬ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、漢方薬のことをご理解いただいている医師、薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剤盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

 剤盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号