

この添付文書は、お薬とともに保管し、
服用の際には、必ずお読み下さい。

【生薬製剤】

強 回 血[®] 散

第3類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- 1ヵ月位(痔出血に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

当帰芍薬散適応症者^{a)}の次の諸症：貧血、月経不順、冷え症、脚気、痔核^{b)}、脱肛^{c)}、痔出血、胃アトニー^{d)}、頭痛、帯下^{e)}、妊娠腎^{f)}、月経痛、ヒステリー、腎臓病、更年期障害、子宮後屈

- 当帰芍薬散適応症者：体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があるような体質の人を示します。
- 痔核：いぼ痔のことを示します。
- 脱肛：で痔のことを示します。
- 胃アトニー：胃の緊張や運動能力が低下した状態を示します。
- 帯下：おりもののことを示します。
- 妊娠腎：妊娠が原因でおこる腎機能の障害のことを示します。

用法・用量

次の量を食前又は食間^{注)}に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「食間」とは食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回量		1 日服用回数
	容器入りの場合	分包品の場合	
大 人	1.5g(添付のサジ1.5杯)	1 包	3 回
10歳以上15歳未満	大人の2/3の量(1.0 g)	2/3包	
5歳以上10歳未満	大人の1/2の量(0.75g)	1/2包	
5 歳未満	服用しないこと		

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤4.5g又は3包中

シャクヤク……0.923g	} エキス……1.708mL (固形物として0.231g)	シャクヤク末……1.553g
センキュウ……0.692g		センキュウ末……0.776g
トウキ……0.692g		ソウジュツ末……0.388g タクシャ末……0.776g トウキ末……0.388g ブクリョウ末……0.388g

- 本剤は灰褐色で、特異なおいを有し、味はわずかに辛い散剤です。
- 本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

(裏面へ)

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

強回血散は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師、薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

製造販売元

剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号